

**ЧТО
НАДО ЗНАТЬ
О ТУБЕРКУЛЕЗЕ**

КАШЛЕВОЙ ЭТИКЕТ ПРИКРЫВАЙТЕ РОТ ПРИ КАШЛЕ

При кашле
или чихании
прикрывайте рот
бумажным платком!



Использованный
платок
бросайте
в мусорную
корзину!

При кашле или
чихании
прикрывайте
рот верхней
частью
рукава, но не
рукой!

МОЙТЕ РУКИ ПОСЛЕ ЧИХАНИЯ И КАШЛЯ

Для защиты
других
пациентов
Вас могут
попросить
надеть маску



**Если Вы
у себя или
своих близких
заметили
эти симптомы,
Вам необходимо
срочно
обратиться
к врачу**

- Уменьшение массы тела при обычном питании
- Утомляемость и общая слабость
- Болезнь в груди
- Повышенная температура
- Кашель более 3-х недель
- Наличие в мокроте примесей крови
- Потливость по ночам
- Потеря аппетита

**Туберкулез –
опасное
инфекционное
заболевание,
которым
может
заразиться
каждый!**



Как защитить себя и ребенка от туберкулеза?

Пути передачи



Симптомы

ВНИМАНИЕ! Часто туберкулез протекает в форме обычной простуды или пневмонии.



Профилактика

- Regular cleaning and ventilation of rooms.
- Individual cutlery (especially outside the home).
- Improving immunity (sunbathing, vitamins, sports).
- A healthy lifestyle, proper nutrition.
- Avoiding people who cough.
- Not smoking.

ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ПОРАЖАЮТСЯ, ЛЕГКИЕ, ЛИМФОУЗЛЫ, ПОЧКИ, КОСТНАЯ СИСТЕМА, МОЗГ, ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ.

Защита

Прививка БЦЖ или БЦЖ-М (делают в роддоме, поликлинике или туберкулезном диспансере на 3-7 сутки после рождения, в 7 и 14 лет)

Ежегодная проба Манту (ставят в детсадах, школах, поликлиниках 1 раз в год)

Диаскинтист (ставят как Манту с 1 года 1 раз в год)